

Indicaties voor maagbescherming met protonpompremmer bij gebruik van een **niet-selectief NSAID** zijn:

- leeftijd > 70 jaar;
- ulcus of maagcomplicaties in voorgeschiedenis ongeacht de leeftijd.
- Tevens bij aanwezigheid van 2 of meer van de volgende factoren:
 - leeftijd tussen 60 en 70 jaar;
 - ernstige invaliderende reumatoïde artritis, hartfalen of diabetes;
 - hoge dosering van het niet-selectieve NSAID;
 - comedicatie met meer kans op maagcomplicaties: cumarinederivaat, P2Y12-remmer, laaggedoseerde salicylaat, systemisch werkende corticosteroïd, SSRI, venlafaxine, duloxetine, trazodon en spironolacton.

Indicaties voor maagbescherming met protonpompremmer bij gebruik van een **laaggedoseerde salicylaat** zijn:

- leeftijd > 80 jaar;
- leeftijd vanaf 70 jaar en co-medicatie met groter risico van maagcomplicaties: cumarinederivaat, P2Y12-remmer, systemisch werkende corticosteroïd, SSRI, venlafaxine, duloxetine, trazodon en spironolacton;
- leeftijd vanaf 60 jaar in combinatie met een ulcus of complicatie daarvan in de voorgeschiedenis.