

Bijlage 9.5a Monitoring van bijwerkingen bij gebruik van klassieke antidepressiva, SSRI's, SNRI's en mirtazapine

Bijlage 9.5a

Monitoring van bijwerkingen bij gebruik van klassieke antidepressiva (X), SSRI's (Y), SNRI's (Z) en mirtazapine (als Z).¹

	T=0	T=3 wkn	T=3 mnd	T=6 mnd	T=12 mnd	Jaarlijks
<i>Medicatiehistorie en leefstijl</i>						
Medicatiehistorie	X, Y, Z	X,Y,Z: bij elk contact met een voorschrijver				
Roken/alcohol/drugs	X, Y, Z		X, Y, Z	X, Y, Z	X, Y, Z	X, Y, Z
<i>Metabool syndroom</i>						
Lengte	X, Y, Z					
BMI	X, Y, Z	X, Y, Z	X, Y, Z	X, Y, Z	X, Y, Z	X, Y, Z
Buikomvang	X, Y, Z	X, Y, Z	X, Y, Z	X, Y, Z	X, Y, Z	X, Y, Z
HbA _{1c} en (nuchter) glucose	X, Y, Z			X, Y, Z	X, Y, Z	X, Y, Z
Lipiden	X, Y, Z			X, Y, Z	X, Y, Z	X, Y, Z
<i>Cardiovasculaire parameters</i>						
ECG	X ¹	X ¹		X ²	X ²	X ²
Bloeddruk (liggend/staand)	X, Z	X, Z	X, Z	X, Z	X, Z	X, Z
Hartfrequentie	X, Z	X, Z	X, Z	X, Z	X, Z	X, Z
<i>Bloedspiegels</i>						
Geneesmiddelspiegel	X: Bij instellen op effectieve dosering en bij dosiswijzigingen					
<i>Hematologie</i>						
Volledig bloedbeeld	Alleen op indicatie ³					
<i>Leverfunctie</i>						
AF, ALAT, ASAT, GammaGT en bilirubine	Alleen op indicatie					
<i>Nierfunctie en elektrolyten</i>						
eGFR	X, Y, Z	X, Y, Z		X, Y, Z	X, Y, Z	X, Y, Z
Natrium	X, Y, Z	X, Y, Z		X, Y, Z	X, Y, Z	X, Y, Z
Kalium	X, Y, Z	X, Y, Z		X, Y, Z	X, Y, Z	X, Y, Z
<i>Overige parameters</i>						
Zwangerschapstest	X,Y,Z: alleen bij onzekerheid over een eventuele zwangerschap					

¹ alleen bij de start en bij significante dosiswijzigingen bij patiënten met risicofactoren²⁸; verder op indicatie

² alleen bij patiënten met de belangrijkste risicofactoren (zie tabel 2)²⁸; verder op indicatie

³ alleen structureel monitoren bij een patiënt met een bloedaandoening in de voorgeschiedenis of bij een rechalleng; verder op indicatie