



## Beslisregel longembolie

### Beslisregel en risicoscore (Wells-regel longembolie)

1.	Klinische tekenen van trombosebeen (ten minste zwelling en pijn bij palpatie)	3
2.	Longembolie waarschijnlijker dan alternatieve diagnose	3
3.	Hartfrequentie hoger dan 100/min	1,5
4.	Immobilisatie (ten minste 3 dagen) of operatie in 4 voorafgaande weken	1,5
5.	DVT of longembolie in voorgeschiedenis	1,5
6.	Hemoptoë	1
7.	Maligniteit (tot 6 maanden na laatste behandeling, of tijdens palliatie)	1

Score ≤ 4: niet verhoogd, bepaal D-dimeer

Score ≥ 4,5: verhoogd, verwijs naar internist of longarts

## Beslisregel DVT

### Beslisregel en risicoscore (Eerstelijnsbeslisregel DVT)

1.	Mannelijk geslacht	1
2.	Gebruik systemische oestrogenen (zoals anticonceptiepil, hormoonring/pleister) of prikpil <sup>15)</sup>	1
3.	Aanwezigheid maligniteit	1
4.	Operatie ondergaan in de laatste maand	1
5.	Afwezigheid van trauma dat zwelling in kuit verklaart	1
6.	Uitgezette venen van het been	1
7.	Verskil maximale kuitomvang ≥ 3 cm	2

Score ≤ 3: niet verhoogd, bepaal D-dimeer

Score ≥ 4: verhoogd, vraag echografie van het been aan